



لقاح كوفيد-19

الأهمية:

اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، شأنه شأن جميع اللقاحات يعلم الجسم أن يحارب ضد جرثومة من الجراثيم التي تسبب المرض. تحميك اللقاحات الشائعة الأخرى من الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والكزاز (التيتانوس). ويمكننا إبطاء انتشار فيروس كورونا بنجاح عندما يتم تطعيم 70% إلى 80% من الشعب.



الأنواع والطريقة:

وكمعظم اللقاحات، فإن لقاح كوفيد-19 هو حقنة تُعطى في الذراع أو عضلة كبيرة أخرى. وستحتاج إلى حقنتين - تبدأ الأولى في بناء مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، أما الثانية فهي حقنة "معززة" لزيادة الحماية ضد الفيروس. ويجب إعطاء الحقنة الثانية بعد أسبوعين من الحقنة الأولى.



الفئات التي تحصل على اللقاح:

يتم تطعيم الأشخاص الذين يبلغون عمر 65 عامًا وأكبر وبعض العمال الأساسيين. وفي الأسابيع والأشهر القادمة، سوف تتمكن أنت أيضًا من الحصول على اللقاح. يجب تطعيم جميع البالغين. يجب على الأشخاص الذين كان لديهم ردود فعل تحسسية تجاه اللقاحات أو الحُقن الأخرى في الماضي أن يسألوا مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم. لا يمكنك الحصول على اللقاح إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الوقت الحاضر.



طريقة التسجيل للاستفادة من هذه الخدمة:

سوف تتواصل معك العيادة الصحية الخاصة بك لتحديد موعد عندما تكون قادرًا على تلقي اللقاح. وبعد إعطائك حقنة لقاح كوفيد-19، سوف تقوم عيادتك الصحية بملاحظتك لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي لديك. وبعد ذلك، ستخبرك عيادتك الصحية متى تعود من أجل الحقنة الثانية. المناعة - سوف يستطيع الجسم محاربة فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أسبوعين إلى أسبوعين (1-2) على الأقل بعد الحقنة الثانية.



الآثار الجانبية:

مثلما يحدث مع الحُقن الأخرى، قد تشعر بالتهاب، وتعب، وألم، وربما ارتفاع في درجة حرارة الجسم في يوم تلقي حقنة لقاح كوفيد-19 وبعدها. وهذه الأعراض تعني أن الجسم يبني القدرة على الحماية من فيروس كورونا. وسوف يختفي معظمها خلال يومين (2). وقد تشعر بالمزيد من الأعراض بعد الحقنة الثانية. وتحتاج حقنتين للحماية الكاملة. تذكر، بعد حصولك على اللقاح، "لا يزال" عليك ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة المادية، وغسل يديك.



السلامة:

تقي اللقاحات المعتمدة من الإصابة بعدوى جديدة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وهي آمنة. وفي التجارب السريرية، كان الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أقل عرضة للإصابة بالمرض بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) أو إدخالهم (تنويمهم) المستشفى من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح. تم اختبار اللقاحات على آلاف الأشخاص ولم تنشأ مخاوف جسيمة بشأن الأمان.

